

Rīgas Stradiņa universitāte
Psiholoģijas laboratorija
Testu un aptauju reģistrs

1. Instrumenta nosaukums latviešu valodā, autora vārds uzvārds, adaptācijas vai izveides gads:

Pacientu vērtēts plaukstas novērtējums (PVPN), adaptēja Krustiņa u.c., 2024.

2. Instrumenta nosaukums oriģinālvalodā (adaptētajam instrumentam), autora vārds uzvārds, izveides gads:

Patient Rated Wrist Evaluation (PRWE), MacDermid, J., 1998.

3. Instrumenta vispārīgs raksturojums (ko mēra, cik un kādas skalas un jautājumi, atbilžu sniegšanas forma, atslēga jeb atbilžu interpretācija u.c.):

PVPN tika izstrādāts, lai nodrošinātu standartizētu veidu, kā novērtēt plaukstas locītavas stāvokli no pacienta perspektīvas. Dubultā pieeja, apvienojot gan sāpju, gan funkcionālo novērtējumu, palīdz speciālistiem izprast traucējumu vispārējo ietekmi un pacientu dzīves kvalitāti. PVPN aptauja sniedz iespēju veikt rezultātu izsekošanu, t.i. tās pielietošana ikdienas praksē ļauj sekot līdzi pacientu rezultātiem laika gaitā, tādējādi funkcionējot, kā noderīgs palīginstruments ārstēšanas intervenču iedarbības novērtēšanai (*MacDermid, 1998*).

PVPN ir plaši izmantots novērtējuma instruments, kas izstrādāts, lai novērtētu plaukstas locītavas sāpes un spēju veikt ikdienas aktivitātes cilvēkiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir sūdzības un/vai samazinātas funkcijas plaukstas locītavā. Šī skala var tikt izmantota cilvēkiem, kuriem ir veikta plaukstas locītavas ķirurģiska ārstēšana; dažādas degeneratīvas saslimšanas; traumas vai kādas citas ar plaukstas locītavu saistītas patoloģijas. PVPN var tikt izmantota terapijas ietvaros, lai noteiktu plaukstas funkcionālos traucējumus, izvirzītu terapijas mērķus, kā arī, lai identificētu, vai terapijas laikā ir notikušas izmaiņas.

Mērķis ir atspoguļot pacienta pašvērtējumu par savu sāpju līmeni un spēju veikt dažādas specifiskas ikdienas aktivitātes, tādējādi veicinot plašāku klīnisko novērtēšanu un ārstēšanas efektivitātes uzraudzību.

4. Informācija par instrumenta lietošanas noteikumiem:

Latviskotā versija ir Psiholoģijas laboratorijas rīcībā, taču mūsu rīcībā nav informācijas par instrumenta izmantošanas nosacījumiem, tādēļ lūdzam vērsties pie oriģināla autora/-iem ar lūgumu izmantot latviski adaptēto instrumentu sava darba vajadzībām un vienoties par tā izmantošanas nosacījumiem.

Rakstiski saņemtā atļauja ir jāiesūta Psiholoģijas laboratorijas testu un aptauju reģistra atbildīgajai kontaktpersonai (skat. reģistra web). Jāaizpilda un jāiesūta arī web ievietotais iesniegums. Pēc tam, balstoties uz no oriģināla autora saņemto informāciju un/vai Jūsu iesniegumu, izsniegsim Jums instrumentu.

5. Pamatinformācija par adaptētā vai izveidotā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem (piem. Kronbaha alfas koeficients) un/vai izlases raksturojums:

Adaptācijas pētījumā kopumā tika iekļauti 54 dalībnieki, kur 38 (70%) no tām bija sievietes. Dalībnieku vecums bija no 19 līdz 73 gadiem ($Mdn = 56$). Visu dalībnieku dati tika ievākti 12 mēnešus pēc spieķkaula distālā gala lūzumu ķirurģiskas ārstēšanas.

Sāpju skalā Kronbaha alfa = 0,78. Funkcijas skalas Kronbaha alfa = 0,97. Orģinālajā aptaujā sāpju skalai Kronbaha alfa = 0,90 un funkcijas skalai 0,88.

Informācija sagatavota RSU Psiholoģijas laboratorijā.

Ja Jums rodas jautājumi par šo aprakstu, interesē RSU adaptētie vai izveidotie instrumenti, to pieejamība, izmantošanas iespējas, kā arī rodas jebkuri jautājumi saistībā ar testu un aptauju reģistru, sazinieties ar Psiholoģijas laboratorijas testu un aptauju reģistra atbildīgo kontaktpersonu. Kontaktinformāciju meklējiet reģistra mājas lapā: <https://www.rsu.lv/psihologijas-laboratorija/testu-aptauju-registrs>