


Rīcības algoritms, ja ir aizdomas par pneimoniju bērniem, kas vecāki par trim mēnešiem



		Pneimonijas smagums		
		Viegla	Vidēji smaga	Smaga
SIMPTOMI	Drudzis	38,0–38,5 °C		> 38,5 °C
	Tahipnoja	< 50× ⁻¹ (< 70× ⁻¹ < 1 g. v.)		> 50× ⁻¹ (> 70× ⁻¹)
	Tahikardija	< 110× ⁻¹ 13–18 g. v. / < 130× ⁻¹ 6–12 g. v. < 140× ⁻¹ 2–5 g. v. / < 180× ⁻¹ 1 g. v.		> 110× ⁻¹ / 130× ⁻¹ / 140× ⁻¹ / 180× ⁻¹
	Dehidratācijas pakāpe	< 5%	> 5%	≥ 9%
	Krūškurvja kontrakcijas	Nav	Ir	Ir
	Spēj uzņemt p/o	Jā	Jā	Nē
	Cianoze / SaO₂ ≤ 92%	Nav	Nav	Ir
	Uzvedība	Neizmainīta	Neizmainīta	Uzbudinājums / letarģija
TAKTIKA	Uzsāk AB terapiju			
	Amoksililīns 90 mg/kg dienā, dalot 2 × vai 3 × p/o [A+, B] (5)		Ceftriaksons 100 mg/ kg dienā, dalot 2 × i/v, un klaritromicīns 15 mg/kg dienā, dalot 2 × p/o (13)	
	Ambulatoram pacientam Rtg un asins analīzes neveic [A+, A-] (4, 8, 12)		Bērnu stacionē	
	Nodrošina p/o vai i/v rehidratāciju			
	Stacionētam pacientam veic Rtg, PAA, CRO, asins gāzes u. c. izmeklēšanu [1b] (3)			
Veic Rtg thoracis AP projekcijā, <ul style="list-style-type: none"> • ja ir aizdomas par pleirītu / izsvīdumu; • vai iepriekš saņēmis AB terapiju 48 stundas bez efekta [II] (6, 9, 10, 13) 				

Indikācijas stacionēšanai

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vecums < 3 mēn. <input type="checkbox"/> Toksisks izskats <input type="checkbox"/> SaO₂ ≤ 92% vai cianoze <input type="checkbox"/> Respiratorais distress, apnoja <input type="checkbox"/> Dehidratācija, nespēja tolerēt p/o uzņemto | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pleiopneimonija <input type="checkbox"/> Pagājušas 48 stundas, kopš uzsākta AB terapija, bet nav efekta <input type="checkbox"/> Imūnkompromitēts pacients vai pacients ar blakuslimbām, kas var ietekmēt slimības gaitu <input type="checkbox"/> Sociāls risks (5) |
|--|---|